



# PROCESSO SELETIVO 2022

## ODONTOLOGIA

### Justiça Federal

### Seção Judiciária do Amapá

\* Obrigatória

#### LÍNGUA PORTUGUESA

1. Por que a ômicron é tão contagiosa?

Segundo a epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS para covid-19, há três razões principais:

- Esta variante do vírus desenvolveu mutações que permitem a ela aderir mais facilmente às células humanas;
- Temos "escape de imunidade". Ou seja, as pessoas podem ser reinfectadas mesmo que tenham tido a doença anteriormente ou tenham sido vacinadas;
- A ômicron se replica no trato respiratório superior, facilitando a propagação do vírus, diferentemente da delta e de outras variantes que se replicam principalmente no trato respiratório inferior — isto é, nos pulmões.

O portal Covid Vaccine Hub indica que é difícil estimar o quão transmissível a ômicron é comparado a outras variantes, mas que algumas estimativas da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido sugerem que ela pode ser entre duas e mais de três vezes mais contagiosa que a delta.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) dizem que "é provável" que a ômicron se propague mais facilmente do que o SARS-CoV-2, vírus original causador da covid-19, mas que "ainda não se sabe" quão fácil se espalha em comparação com a delta.

Os CDC destacam que qualquer pessoa infectada com ômicron pode espalhar o vírus, mesmo que esteja vacinada ou não apresente sintomas.

BBC NEWS

1. Com base no texto acima, observe as informações abaixo:

- O propagar da variante Ômicron, segundo o texto, decorre da ausência de uma vacina específica para combater essa nova mutação.
- As pessoas vacinadas, segundo o texto, não serão contaminadas pela variante Ômicron.
- Os cientistas afirmam que a variante Ômicron se propaga mais facilmente que o vírus da gripe.
- É possível inferir do texto que a variante Ômicron é mais contagiosa que a variante Delta.

Com base nas informações acima, é (são) correta (s) a(s) seguinte(s) informação(ões):

(1 Ponto)

- a) II apenas
- b) IV apenas
- c) III e IV apenas
- d) II e IV apenas
- e) II e III apenas

2. De acordo com a composição do texto e as funções de linguagem, é correto afirmar que, no texto, (1 Ponto)

- a) Predomina a função de linguagem referencial.
- b) Predomina o tipo narrativo.
- c) Predomina no texto a função emotiva.
- d) Predomina no texto o tipo expositivo-injuntivo
- e) Predomina no texto o tipo expositivo e a função poética.

3. "Segundo a epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS para covid-19, há três razões principais:"

A passagem acima foi reescrita, sem prejuízo ao sentido original e à norma culta, em:

(1 Ponto)

- a) Conforme a epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS para covid-19, existe três razões principais:
- b) epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS para covid-19, explica, que há três razões principais:
- c) Em consonância com a epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS para covid-19, existem três razões principais:
- d) Conquanto a epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS para covid-19, existem três motivos principais.
- e) De acordo com a epidemiologista Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS para covid-19, existe três motivos principais:

4. O acento indicativo de crase foi corretamente utilizado em:

(1 Ponto)

- a) Encaminho à vossa senhoria cópia dos relatórios financeiros.
- b) Ressaltou à importância do controle interno.
- c) Mostre à todos as novas regras de segurança.
- d) Em relação à esta questão, é necessário fazer um trabalho mais detalhado.
- e) Devido àquelas questões, uma nova reunião deve ser agendada.

5. As normas de concordância verbal foram plenamente respeitadas em:

(1 Ponto)

- a) A análise sobre os aspectos relacionados à variante ômicron revelaram o seu poder de transmissão.
- b) Foi registrado, no último boletim informativo, inúmeros casos de Covid-19.
- c) Cada de um nós devemos continuar com as medidas de proteção contra a Covid-19.
- d) Medicamentos e profissionais não havia naquele hospital.
- e) As vacinas, de acordo com a OMS, possui um papel fundamental no combate à pandemia.

## RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

### 6. B3 – E6 – I18 – \_\_\_\_\_

Considerando-se a lógica adotada na sequência acima, pode-se deduzir que a lacuna será preenchida por:  
(1 Ponto)

- a) N72
- b) O36
- c) N36
- d) O72
- e) P54

7. Dezoito estagiários analisam, durante o mês, cento e dezesseis processos. Sendo assim, sabendo que todos os estagiários possuem a mesma capacidade e que os processos possuem o mesmo grau de complexidade, é possível afirmar que quatrocentos e trinta e sete estagiários analisarão, durante um mês, aproximadamente:  
(1 Ponto)

- a) 2816 processos
- b) 2912 processos
- c) 3316 processos
- d) 2214 processos
- e) 1736 processos

8.

Observe a sequência de palavras abaixo:

Reviver – reger – mirim – ata – **X**

Considerando-se a lógica adotada nessa sequência, pode-se deduzir que a palavra que deverá ocupar o lugar de **X** será:  
(1 Ponto)

- a) vida
- b) aval
- c) Assado
- d) esse
- e) Isa

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTOLOGIA

9. O processo clássico de diagnóstico da doença cárie dentária envolve três passos principais. Primeiro, a análise das informações obtidas por meio da anamnese. Em seguida, a análise dos sinais e sintomas da doença por meio de exames clínicos e complementares e, por fim, a verificação da extensão das lesões de cárie por meio de exame radiográfico. Sendo assim, assinale a alternativa correta:

(1 Ponto)

- a) O cirurgião-dentista deverá priorizar no plano de tratamento somente as estratégias para os sinais clínicos.
- b) Lesões de cárie ativas em esmalte dentário apresentam-se opacas, lisas e brilhantes.
- c) O uso do exame radiográfico como método adjunto à inspeção visual permite uma detecção mais sensível de lesões de cárie interproximais e oclusais em dentina.
- d) Para melhor utilizar a inspeção visual durante o exame clínico-bucal, deve-se realizá-lo antes da profilaxia dentária.
- e) Lesões de cárie inativas em esmalte dentário apresentam-se lisas, opacas e sem brilho.

10. A prescrição de medicamentos na clínica odontológica deve ser feita, preferencialmente, pelo nome farmacológico pelos seguintes motivos, **EXCETO**:

(1 Ponto)

- a) Evita confusões – há muitos nomes comerciais para um mesmo princípio ativo;
- b) Facilita a busca de informações sobre o medicamento, inclusive de fontes internacionais;
- c) Permite ao paciente a compra de um medicamento de menor custo;
- d) Restringe a substituição de medicamento pelo farmacêutico.

11. Paciente do sexo masculino, com 39 anos de idade, queixa-se de dor ao morder e relata um procedimento restaurador no dente 17 realizado há 10 dias. Ao exame clínico, observa-se restauração no referido dente com contato prematuro. As respostas aos testes de sensibilidade térmica são normais e a dor é desencadeada pelo teste de percussão. O tratamento indicado é:

(1 Ponto)

- a) Pulpectomia e restauração definitiva.
- b) Terapia antibiótica e preservação.
- c) Instrumentação dos canais radiculares e medicação intracanal.
- d) Apicectomia e preservação.
- e) Ajuste da oclusão e acompanhamento.

12. Sobre a relação da doença periodontal com a *diabetes mellitus*, é **CORRETO** afirmar:

(1 Ponto)

- a) A diabetes mellitus não influencia no processo de perda óssea da doença periodontal.
- b) Existe uma relação de mão dupla entre diabetes mellitus e doença periodontal.
- c) A doença periodontal irá contribuir para um pior controle metabólico apenas nos indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 2.
- d) No tratamento periodontal, a antibioticoterapia deverá ser realizada durante o tratamento de todos os indivíduos portadores de diabetes mellitus.

13. Paciente do gênero masculino, 46 anos, com interferência oclusal e lesão em forma de cunha ou "V" na região cervical do dente 34. Este quadro clínico representa:

(1 Ponto)

- a) Lesão cariosa
- b) Cavidade por uso de escova dura
- c) Erosão
- d) Abfração
- e) Atrição

14. Qual dos medicamentos abaixo não está associado com hiperplasia gengival medicamentosa:

(1 Ponto)

- a) Ciclosporina.
- b) Nifedipina.
- c) Fenitoína.
- d) Amoxicilina.
- e) Nenhum dos medicamentos citados acima.

15. O tratamento restaurador atraumático (ART) foi desenvolvido para combater a cárie dentária em locais de difícil acesso. Essa técnica:

(1 Ponto)

- a) Pode ser indicada livremente em qualquer tipo de lesão de cárie dentária.
- b) Preconiza instrumentos cortantes manuais, dispensando o uso de instrumentos cortantes rotatórios de alta e baixa rotação.
- c) Preconiza maior adesividade química com o uso de ácido fosfórico a 37%.
- d) Dispensa outras preocupações preventivas com o paciente, pois a liberação de flúor do cimento de ionômero de vidro é suficiente.
- e) Utiliza o cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável de longa duração e alta resistência à compressão.

16. Em qual condição é indicado realizar profilaxia antibiótica, prévia ao tratamento odontológico invasivo, para endocardite infecciosa?

(1 Ponto)

- a) Usuários de prótese cardíaca.
- b) Em pacientes grávidas.
- c) Fumantes.
- d) Antes de todas as extrações de dentes inclusos.

17. O uso de agentes químicos no controle do biofilme dental é bastante difundido, principalmente pela mídia. Ao orientar nossos pacientes, é correto afirmar que:

(1 Ponto)

- a) A utilização de agentes químicos para controle de biofilme pode ter finalidade terapêutica e profilática.
- b) O Triclosan provou ser o agente antimicrobiano mais eficaz entre os produtos comerciais disponíveis.
- c) O uso de agentes químicos no controle do biofilme dental, através de bochechos, já pode ser indicado como substituto ao controle mecânico nos dias atuais.
- d) Ainda não foi possível adicionar agentes com ação antimicrobiana aos cremes dentais.

18. Durante o período de formação e desenvolvimento dos germes dentários dos dentes permanentes, existem algumas recomendações. Assinale a **CORRETA**:

(1 Ponto)

- a) As crianças devem escovar os dentes de leite ou decíduos com creme dental sem flúor para evitar a fluorose nos dentes permanentes.
- b) As crianças devem ser supervisionadas diretamente pelos pais, durante a escovação, evitando a ingestão excessiva de creme dental.
- c) Não existe recomendação, pois a formação e o desenvolvimento destes germes acontece ainda na vida intra-uterina.
- d) As crianças devem evitar usar as águas de abastecimento público para a higiene bucal, pela falta de legislação sobre o controle de qualidade das mesmas.

19. A pasta iodoformada reabsorvível, ou pasta III, preconizada por Guedes-Pinto, é utilizada para o preenchimento de canais decíduos quando se realiza a terapia pulpar radical. Os componentes dessa pasta são:

(1 Ponto)

- a) Iodofórmio, paramonoclorofenol canforado e rifocort.
- b) Iodofórmio, paracetamol canforado e rifamicina sódica.
- c) Iodofórmio e formocresol e rifamicina sódica.
- d) Iodofórmio, formocresol e cânfora.
- e) Iodofórmio, carbowax e rifocort.

20. As opções a seguir apresentam microrganismos reconhecidos como sendo importantes periodontopatógenos, **a exceção de uma**. Assinale-a.

(1 Ponto)

- a) Tannerella forsythia.
- b) Treponema denticola.
- c) Porphyromonas gingivalis.
- d) Streptococcus sanguinis.
- e) Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

## QUESTÃO DISCURSIVA

21. **Paciente T.M.B., gênero feminino, 25 anos, apresenta sangramento a sondagem, grande quantidade de placa e cálculo nos incisivos inferiores e profundidade de sondagem de 5 mm na mesial do 36 e do 47. Ao exame radiográfico foi detectado que a mesma não possuía perda óssea alveolar. Qual o diagnóstico do caso em questão? Elabore um plano de tratamento. \***

22. NOME: \*

23. CPF: \*

O valor deve ser um número

24. INSTITUIÇÃO DE ENSINO: \*

25. SEMESTRE: \*

O valor deve ser um número

---

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms